

大腸鏡檢查

在肛門放置軟性纖維內視鏡，觀察直腸及整個大腸內的組織變化。如有可疑病灶組織或瘻肉，立即行切片檢查或切除術。

檢查前的準備：


1. 填妥檢查同意書及說明書。
2. 檢查前二到三天宜進食低渣飲食，如稀飯、蛋花湯、白吐司、碎肉等。



1. 檢查前一天應進食無渣流質飲食，如茶、蜂蜜、糖、汽水、魚湯等；但忌喝豆漿、牛奶或其它有渣的食物。



2. 檢查前一天傍晚開始服用瀉藥，服藥後應大量喝水2000cc以上。



3. 下午檢查者，可少量進食無渣流質飲食。
4. 平日服用降血壓及心臟用藥可繼續服用，若有服用抗凝血劑，請依醫師指示停藥，但糖尿病者，降血糖藥物檢查當天暫停服用，待檢查結束後，可進食後再服藥。

檢查過程：

1. 檢查時，採屈膝左側臥式。
2. 大腸內視鏡插入肛門後，會打入少量空氣以協助定位腸腔。
3. 內視鏡到達乙狀結腸處時，會協助將姿勢改變成仰臥姿勢，以利內視鏡通過結腸右曲部。
4. 此項檢查不需麻醉。若病人較為緊張或因腸道沾粘、腸道過度彎曲檢查困難，請與醫師諮詢，可選擇自費麻醉，以減少不舒服程度，此時需有家屬陪同。
5. 檢查過程中若有任何不舒服，請主動告知現場醫護人員。

檢查後注意事項：

1. 藥物(止痛劑、鎮靜劑、麻醉劑)的作用，會有頭暈及昏睡無力感，姿勢改變時需注意安全，當日檢查後不要開車或從事精神集中之工作。
2. 檢查後會有輕微腹脹、腹部不適情形，排氣後會改善。若嚴重腹痛或肛門出血，請立即通知醫護人員。
3. 當日檢查後，可以恢復正常飲食。
4. 有做切片檢查或瘻肉切除術者，當日宜進食低渣食物，隔日再逐漸增加纖維含量之食物，並避免食用刺激、辛辣食物，以防止腸道過度刺激而導致切片傷口出血情形。
5. 大腸鏡檢查在極少數人的身上，可能會造成大腸穿孔或大出血的併發症，此時需住院觀察。

諮詢電話:049-2912151

轉門診分機:4212

資料來源：照片由網路截取