

檢驗名稱	ADA	中文名稱	腺甘脫胺酶
檢驗代碼	ada	健保編號(點數)	09102B(240)
檢體種類	Body Fluid / CSF	檢驗方法	UV-Rate method
採集容器	不含 Gel 血清試管	操作時間	每週一、四
採檢體量	2 mL 以上	報告時間	7 天
送檢時間	每日	操作單位	部立台中醫院醫事檢驗科
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	Body Fluid : <40 U/L CSF : <9 U/L		
臨床意義	<p>1.增加：</p> <p>肝臟疾病：急性黃疸性肝炎，肝細胞出現損傷，在黃疸尚未出現前，可見增高。因ADA分子量較ALT小，當肝細胞輕度受損時ADA比ALT先釋入血內。慢性肝炎活動期，慢性遷延性肝炎升高明顯，肝硬化、原發性肝癌，ADA活性也升高。</p> <p>溶血性黃疸，肝細胞性黃疸ADA升高。但阻塞性黃疸時ADA升高不明顯，因此在判斷黃疸性質時有一定的鑒別價值。惡性腫瘤，網狀細胞瘤，淋巴瘤，急性白血病可升高。結核性胸水中ADA活性明顯高於其他原因引起的胸水，因此可以測定胸水中的ADA來進行鑒別診斷。</p> <p>2.減少：嚴重聯合免疫缺陷病(ADA缺乏症)</p>		
備註	<p>一、參考檢驗：無。</p> <p>二、干擾因素：無。</p> <p>三、注意事項：無。</p>		

修訂日期：2024.10.1