

檢驗名稱	FDP-定量quantitative	中文名稱	纖維元蛋白分化物
檢驗代碼	fdp	健保編號(點數)	08038B(600)
檢體種類	Plasma	檢驗方法	Latex Immunoassay
採集容器	3.2% Sodium Citrate 淺藍色管	操作時間	每天
採檢體量	1.8 mL	報告時間	3 天
送檢時間	每日	操作單位	大安聯合醫事檢驗所代檢
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	請於一個小時內離心血漿冷凍保存，可在-20°C保存兩週		
生物參考區間	<5 ug/mL		
臨床意義	<p>Fibrin 及Fibrinogen 經由plasmin 切割形成FDP 碎片，代表凝固活化，當FDP 大量存在時會干擾hemostatic plug formation，代表異常的fibrinolysis，超過40 ug/mL，為危險值，很可能是DIC。</p> <p>上升於胎盤過早剝落、動脈瘤、輸血反應、腦傷、燒傷、癌症、酒精性肝硬化、深部血管栓塞、DIC(disseminated intravascular coagulation)、肺栓塞、腎病、呼吸窘迫、菌血症、休克，FDP 也可作為使用streptokinase 之評估。</p>		
備註	<p>一、參考檢驗：</p> <p>(1) 血液檢查：CBC-I、PT、APTT、Dimer、Fibrinogen。</p> <p>(2) 生化檢查：AST、ALT。</p> <p>二、干擾因素：無。</p> <p>三、注意事項：</p> <p>(1) 檢體和抗凝劑混合均勻。</p> <p>(2) 如果受檢者有凝固的障礙，必須壓住抽血點5 分鐘以上，密切觀察有否hematoma。</p>		

修訂日期：2024.10.1