

| | | | |
|----------------|---|----------|-----------------|
| 檢驗名稱 | HSV II IgG | 中文名稱 | 單純疱疹病毒抗體 II-IgG |
| 檢驗代碼 | hsvg2 | 健保編號(點數) | 14069B(135) |
| 檢體種類 | Serum、Plasma | 檢驗方法 | ELISA |
| 採集容器 | 含Gel紅頭管、Heparin綠頭試管 | 操作時間 | 每週一、三、五 |
| 採檢體量 | 血清、血漿 1mL 以上 | 報告時間 | 6 天 |
| 送檢時間 | 每日 | 操作單位 | 部立台中醫院醫事檢驗科 |
| 採檢注意 (病人準備) | 無 | | |
| 檢體保存 | 2-8°C 保存 | | |
| 生物參考區間 | Negative : < 16 RU/ml Borderline : ≥ 16 to < 22 RU/ml Positive : ≥ 22 RU/ml | | |
| 臨床意義 | <p>(1) 單純疱疹病毒是會導致皮膚與黏膜上出現水疱的一種疾病。HSV-1和HSV-2 可能傳染人和其它動物，但只有人類會顯示疾病的症狀，HSV-1和HSV-2病毒被發現在損害的皮膚中，並且存在於各種的體液裡，包括唾液和陰道分泌物。其普遍流行在世界各地且緩慢正常地進行，常使內部器官受影響且壞死而造成併發症。單純疱疹病毒1型好發於口鼻，2型則好發於生殖器官。</p> <p>(2) 幾乎所有的病人在感染病毒、病情走完整個過程之後，都測得出HSV-2抗體。超過90%族群感染過HSV-1，HSV-2抗體只有7~20%被發現。</p> <p>(3) 抗體無法阻止復發或再感染，單純疱疹病毒IgG抗體主要用來判斷是否得過疱疹，一旦感染過疱疹則IgG抗體會終生存在(呈陽性)。初次感染HSV-2，常常出現的症狀是頭痛和頸部僵硬。腦膜炎較少被觀察到。新生兒當通過產道時，假如新生兒被感染HSV-2，其皮膚、嘴巴和眼部也會出現疹泡，並伴隨肝脾腫大、黃膽和腦炎。若沒有治療大部分的病例最終都會致命。</p> | | |
| 備註 | <p>一、參考檢驗：無。</p> <p>二、干擾因素： 避免使用嚴重溶血或脂血之檢體，以免影響檢查結果。</p> <p>三、注意事項：無。</p> | | |

修訂日期：2024.10.1