

檢驗名稱	HSV Type I +II IgMAb	中文名稱	單純疱疹病毒 I+II 型 IgM 抗體
檢驗代碼	hsvm	健保編號(點數)	14052B(750)
檢體種類	Serum	檢驗方法	Chemilluminescence
採集容器	含Gel紅頭管	操作時間	每日
採檢體量	3mL 以上	報告時間	6 天
送檢時間	每日	操作單位	大安聯合醫事檢驗所
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	Negative : <0.9 Equivocal : 0.9-1.09 Positive : ≥ 1.1 Index		
臨床意義	本檢查診斷HSV病毒最近感染或病毒再活化，個體免疫反應不同，部份HSV IgG並未上昇至異常高值，可以使HSV IgM協助診斷。診斷疱疹病毒最近感染或者病毒再活化，通常感染後14 天，可以測到IgM抗體陽性，約維持一個月。診斷意義相當於兩次IgG抗體檢驗間隔14天，看到IgG抗體上升兩倍以上。病毒潛伏再活化時IgM抗體不一定可以測得到。這一個檢查使用分型相對特异性比較高的檢驗方法，第一型抗體與第二型抗體以及帶狀疱疹(V. zoster)抗體間的交叉反應幾乎可以忽略。顯微鏡下感染的表皮細胞呈現多核非典型核的上皮細胞。		
備註	一、參考檢驗：無。 二、干擾因素：無。 三、注意事項： (1) 新方法只提供1+2型複合測試，無法單一對各型作分析。		

修訂日期：2024.10.1