

檢驗名稱	IgD	中文名稱	免疫球蛋白 D
檢驗代碼	igd	健保編號(點數)	12030C(180)
檢體種類	Serum	檢驗方法	Turbidimetry
採集容器	含 Gel 紅試管	操作時間	未提供
採檢體量	3mL 以上	報告時間	13 天
送檢時間	每日	操作單位	大安聯合醫事檢驗所轉林口長庚代檢
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	<132.1mg/L。		
臨床意義	<p>IgD分子量為185 kD，為五種免疫球蛋白的一種，IgD主要存在於B淋巴球的表面。IgD的總量小於總血漿免疫球蛋白的1%，其血漿中濃度受到年齡與遺傳的影響。IgD骨髓瘤病人體內IgD濃度顯著增加。高免疫球蛋白D血症(Hyperimmunoglobulinemia D syndrome ,HIDS)病人體內IgD濃度亦顯著增加，患者會有反覆腹部發熱、關節炎與皮膚症狀。</p> <p>上升：多株性：某些肝臟疾病，慢性感染，結締組織病。單株性：IgD多發性骨髓瘤。</p> <p>下降：在很多遺傳性及後天缺乏症，惡性皮膚黑色素瘤，子癲症。</p>		
備註	<p>一、參考檢驗：無。</p> <p>二、干擾因素：無。</p> <p>三、注意事項：無。</p>		

修訂日期：2024.10.1