

檢驗名稱	Measles virus IgM Ab	中文名稱	麻疹病毒 IgM 抗體
檢驗代碼	measg	健保編號(點數)	14007B(750)
檢體種類	Serum	檢驗方法	Euroimmun, ELISA
採集容器	含Gel紅頭管	操作時間	每日
採檢體量	3mL 以上	報告時間	10 天
送檢時間	每日	操作單位	大安聯合醫事檢驗所
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	Negative : <0.8 ratio Borderline : $\geq 0.8 \sim < 1.1$ ratio Positive : ≥ 1.1 ratio		
臨床意義	Measles經由直接接觸及飛沫傳染，發燒後三天臉部出現紅疹，繼而發展維持一週，包括Koplick's spots in themouth(帶有紅暈的小白斑，存在於面頰黏膜)、rose-colored maculopapular skin eruptions(斑點丘疹)，對光敏感，catarrhal syndromes(黏膜炎)。血清檢查可以協助診斷麻疹感染，症狀出現後一週可以測到抗體。因此，急性期與恢復期兩支血清(間隔1-4週)測到IgG抗體上升兩倍以上；或者急性期陰性、恢復期陽性；或者測到Measles IgM陽性，代表麻疹的感染。		
備註	一、參考檢驗：Measles Ab(IgG)。 二、干擾因素：無。 三、注意事項： (1) 危險數據：Measles IgM (+)，需通報感控。		

修訂日期：2024.10.1