

檢驗名稱	Varicella zoster-IgG	中文名稱	帶狀疱疹病毒 IgG 連酶抗體試驗
檢驗代碼	vzvg	健保編號(點數)	14068B(200)
檢體種類	Serum、Plasma	檢驗方法	ELISA
採集容器	含Gel紅頭管、Heparin綠頭試管	操作時間	每週一、四
採檢體量	血清、血漿 1mL 以上	報告時間	7 天
送檢時間	每日	操作單位	部立台中醫院醫事檢驗科
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	Negative：<80 IU/L Borderline：≥80 IU/L to <110 IU/L Positive：≥110 IU/L		
臨床意義	Varicella-zoster病毒是造成水痘及帶狀皰疹的病原體，症狀為皮膚損傷及水泡，傳染途徑經由直接接觸、空氣帶有患者分泌物之懸浮微粒等，病毒先於呼吸道複製，再經由血液擴散至皮膚或內部器官，小時後感染的水痘至年長後可能復發為帶狀皰疹。IgG作為感染過之證據，成人抗體陽性率為90%，故大部份人在小時候便已注射疫苗，兩管血清檢體是必要的，可觀察IgG由陰性轉為陽性或從弱陽性轉為強陽性作為診斷的依據。		
備註	一、參考檢驗：無。 二、干擾因素：無。 三、注意事項： (1) 症狀出現時立刻採集第一管檢體，標示為急性期，兩週後採集第二管檢體，標示為恢復期。		

修訂日期：2024.10.1